

# ***Опыт ведения беременности и родоразрешения при многоводии***

***Клинический случай***

***Врач акушер-гинеколог к.м.н.***

***Мозгова Ольга Борисовна***



# Данные обследований

По УЗИ плод соответствует сроку 37 нед и 3 дня,  
ИАЖ=18, ПМП=3300 (79,67%)

По данным доплерометрии - маточно-плацентарный и  
плодовый кровоток не нарушены.

КТГ без патологии.

Фемофлор -  
условный нормоценоз (уреаплазма парвум 10х4, гарднерел  
ла - 10х4)

Флора в основном представлена лактобактериями.  
В посеве - роста уреаплазмы нет.



# Назначено лечение

Беременность 38 нед 3 дня, многоводие  
(индекс амниотической жидкости 25 мм).

**Азитромицин 500 мг 1 раз в сутки 15 дней.**  
**Супракс 1г в сутки 15 дней.**


**Кетоконазол 1 таблетка каждый третий день**  
**- 5 таблеток и капельницы с пептидом - 6**  
**штук каждые 8 часов**

"Для улучшения кровообращения, лечения  
многоводия и воспаления".

Капитальный обзор: 427


№	Наименование исследования	Результат		% от нормы
		Количественный	Качественный (Lg/MCMC)	
1	Анализ крови общий	10.13	C	
2	Общий белок/альбумин/креатинин	10.13	C	
3	Лактоза (г/л)	10.13	12.80 (100%)	
4	Ион. Электролиты	10.13	2.2.2.4.1 (%)	
5	Ферритин (г/л)	10.13	23.8.24 (г/л)	
6	Триглицериды (г/л)	10.13	2.3.8.4.0 (г/л)	
7	Секреторная функция/Результат теста/Регуляторный акт	10.13	4.9.8.1.4 (%)	
8	Свободный акт	10.13	2.1.8.1.4 (г/л)	
9	Анализ мочи/Свободный акт/Регуляторный акт	10.13	2.7.1.1.1 (%)	
10	Мочевина (ммоль/л)	10.13	2.3.1.1.1 (%)	
11	Лактоза (г/л)	10.13	2.3.8.1.4 (%)	
12	Мальтоза (г/л)	10.13	2.3.8.1.4 (%)	
13	Регуляторный акт	10.13	2.3.8.1.4 (г/л)	
14	Анализ мочи	10.13	2.3.8.1.4 (г/л)	
15	Свободный акт	10.13	2.3.8.1.4 (г/л)	
16	Мочевина (ммоль/л)	10.13	2.3.1.1.1 (%)	
17	Мочевина (ммоль/л)	10.13	2.3.1.1.1 (%)	

Значения  
исходный нормальный



## Причины многоводия следующие:

- Пороки развития плода (например, обструкция желудочно-кишечного тракта или мочевыводящих путей)
- Сахарный диабет у матери
- Анемия у плода, в том числе гемолитическая анемия из-за резус несовместимости
- Внутриутробные инфекции
- Генетические аномалии у плода
- Идиопатические



**При многоводии увеличивается риск развития следующих осложнений:**

- Преждевременные схватки и, возможно, преждевременные роды
- Преждевременный разрыв плодных оболочек иногда с последующей отслойкой плаценты
- Неправильное положение плода
- Дыхательная недостаточность у матери
- Выпадение пуповины
- Атония матки
- Послеродовое кровотечение
- Гибель плода (риск повышается даже при идиопатическом многоводии)



Ольга, добрый день! Сегодня сынуля родился 😊 сам, без стимуляций, без окситоцина и вскрытия пузыря и без анестезии 🙌 к 9 вечера по сша начало слегка тянуть живот, я приседала, холила, начали подтекать воды ( это я не сразу поняла). Схватки были вообще не сильно ощутимые. А потом ровно в полночь по нашему времени лопнул пузырь и хлынули воды. В 2:36 ночи малыш уже был у меня на руках 😊 9 из 9 по апгар так что мы с вами все правильно решили - ждать и никого не слушать что все плохо ❤️ спасибо вам огромное за поддержку и консультации ❤️❤️❤️❤️❤️

13:15

